

119 - PERFIL Y CONTROL DE LAS TERAPIAS DOMICILIARIAS DE SOPORTE VENTILATORIO NOCTURNO EN ATENCION 1^a

Martínez J, Díaz M, Morales MJ, González M, Cervantes S, Gil MM
C. S. Antequera
C/ Gra. Rodrigo 6 2º A
Fuengirola 29640 Malaga

INTRODUCCIÓN: las terapias con soporte ventilatorio nocturno (TSVN) son: CPAP, BiPAP o ventilador volumétrico, tratamientos hasta hace unos años de uso hospitalario y que cada vez está siendo más utilizado a nivel domiciliario.

OBJETIVOS: analizar a los pacientes de nuestro área de salud (comarca Antequera) que lo utilizan.

MATERIAL Y MÉTODOS: estudio transversal mediante encuesta telefónica (Diciembre 2000) sobre base de datos de empresa suministradora, con cuestionario clínico formalizado sobre cumplimiento y efectos secundarios.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: entrevistamos a 123 pacientes, 100 hombres y 23 mujeres. Edad 45,79 años. Distribución por años desde inicio de su uso: 1993: 5 pacientes, 1994: 2, 1995: 7, 1996: 7, 1997:8, 1998: 13, 1999: 32, 2000: 49. Indicaciones: síndrome apnea sueño 75, síndrome overlap 24, síndrome hipoventilación-obesidad 18, otros 8. Sobre cumplimiento 112 (91,05%) pacientes cumplen más de 4 horas/noche y 11 (8,94%) menos de 4 horas/noche o bien no lo realizan a diario. Abandonaron 3 (2,43%) debido a intolerancia. Por tanto, la mayor difusión en nuestro área sanitaria de la clínica del SAHOS en la población general, y entre los profesionales de la atención primaria, pueden explicar la tasa de incidencia creciente. La tasa de abandonos es muy baja y el cumplimiento muy elevado. Su control desde la atención primaria puede ser básico en los próximos años.