

39 - ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS FIBROGASTROSCOPIAS SOLICITADAS DESDE EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Mussoll, J; Serra, P; Arrufat, J; Torrellas, E; Gost, J .
ABS Cirera-Molins MATARÓ (Barcelona).
Rda Frederic Mistral, s/n
MATARÓ 08304
Barcelona 93.757.55.54

OBJETIVO: Conocer el motivo de consulta, patología hallada, actitud post-endoscópica y tiempo de espera para la realización de una Fibrogastroscoopia (FGC) en nuestro centro de salud.

DISEÑO: Estudio descriptivo retrospectivo.

ÁMBITO: ABS urbana de 18.000 habitantes.

SUJETOS: Mayores de 18 años a quienes se les solicitó una FGC por parte del su médico de AP durante el intervalo 1995-1999.

MEDICIONES: Revisión de historias, analizando: datos de filiación, motivo de solicitud, diagnósticos, tratamiento previo, actitud postendoscópica y tiempo de espera para la realización de la FGC.

RESULTADOS: De 207 FGC solicitadas el 51,6% mostraron patología. La edad media fue de 50 años, predominando el sexo masculino(59%). Los motivos de consulta predominantes fueron las epigastralgias (63,7%), pirosis (33,8%), dispepsia (18,8%), reflujo gastroesofágico (RGE) (12%) y anemia (6,2%). Los diagnósticos: H.Hiatus 23,6%; esofagitis 10,1%; (asociación de las dos patología 4,8%), ulcus 8,2%; lesiones agudas de la mucosa gástrica (LAMG) 8,2%, duodenitis 6,7%; helicobacter 5,3%. Tiempo de espera 24,5 días. Tratamiento previo 61%. Tratamiento posterior 53,3%. Derivación al digestólogo 2,4%; derivación al cirujano 1,4%.

CONCLUSIONES:

- 1-Alta prevalencia de patología en las FGC solicitadas.
- 2-Edad media de 50 años con predominio del sexo masculino.
- 3-Predominio de epigastralgia como síntoma principal, seguido de pirosis y dispepsia.
- 4-La Hernia de hiatus es la patología más prevalente, seguida de la esofagitis.
- 5-El 20,4% de las H. de Hiatos presentan asociada esofagitis y el 4% RGE
- 6-Consideramos un tiempo de espera razonable para la realización de la FGC.
- 7-La FGC permite reducir el número de tratamientos en pacientes con sintomatología digestiva alta.
- 8-La derivación al digestólogo es de 2,4% y al cirujano del 1,4%.